

Лечение болезни клапанов сердца





Медикаментозное лечение

- Регулярно приходите к своему врачу на приемы
- Принимайте все лекарственные препараты, согласно указаниям Вашего врача
- Отказ от курения
- Правильно питайтесь
- Физическая нагрузка
- Контролируйте свое артериальное давление



Хирургическое лечение

- Восстановление клапана
- Установка нового клапана
- Существуют различные виды операции на сердечных клапанах
 - Традиционная операция = большой разрез
 - Минимальное оперативное вмешательство = меньшие разрезы



Изображение использовано с разрешения Edwards Lifesciences, ©2014

Схемы лечения, предусматривающие катетер

- Катетер — это длинная тонкая трубка, которую можно использовать для восстановления клапана или установки нового клапана.
- Для операции TAVR используется катетер для замены аортального клапана
- MitraClip — это небольшое устройство, которое способствует более плотному закрытию митрального клапана
- Для операции TMVR используется катетер для замены митрального клапана
- Для баллонной вальвулотомии используется катетер с крошечным баллоном на конце. Баллон позволяет раскрыть узкий митральный или аортальный клапан, чтобы большее количество крови могло течь через него.

Лечение болезни клапанов сердца



Советы по сохранению клапанов здоровыми

Советы по уходу за сердцем после операции и действия по недопущению ухудшения состояния клапана, не получившего лечения:

- Регулярно посещайте кардиолога



- Принимайте все свои лекарства, согласно указаниям Вашего врача



- Контролируйте свое артериальное давление



- Делайте профилактику инфекции клапанов сердца (эндокардит)



- Ухаживайте за зубами и деснами – Чистите зубы и регулярно посещайте стоматолога для прохождения осмотров

- Спросите своего врача, нужно ли Вам принимать лекарства для профилактики инфекции перед прохождением медицинских или стоматологических процедур



- Избегайте грязных игл, которые могут использовать для татуировок, пирсинга и внутривенного употребления наркотиков



- Позвоните своему врачу, если у Вас возникнут признаки инфекции

